

Красное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Красная клиническая больница
ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022
Телефон: 8 (391) 220-15-13
Факс: 8 (391) 220-16-23
E-mail: kkb@medgord.ru
http://www.kkb1.krasn.ru
ОКПО 01912234
ИНН 39120-000876/24630100
ПВ 39120-000876/24630100
Итого: 8 286-5-2021
от
О коммерческом предложении

Руководитель

Уполномоченный руководителем

Администрация Красного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Красная клиническая больница» просит предоставить коммерческое предложение с указанием цены на следующий товар:

№ п/п	Наименование	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во, шт	Цена, руб/шт	Страна происхождения	Остаточный срок годности
1	Дезинфицирующее средство	Дезинфицирующее средство в виде готовой к применению прозрачной бесцветной жидкости в виде порока со слабым специфическим запахом и/или запахом применяемой отдушки. Не содержит спирта, неограниченные инновационно-активные вещества, вспомогательные компоненты. Антибактериальная активность. Средство обладает антибактериальной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза, вирусы, грибки), дрожжевых, кожно-резистентных, децимирующих микроорганизмов. По параметрам токсичности относится к 4 классу малоопасных веществ (ГОСТ 12.007-76), не обладает выраженными местно-раздражающими и раздражающими свойствами, в т.ч. раздражающими биологическими выделениями: мебели, полимеров, выделений по поверхности помещений (операционная, приемная, процедурный кабинет, экстренная помощь и др.), трущихся поверхностей, поверхностей медицинских приборов, оптических приборов и оборудования, датчиков (УЗИ и др.), стоматологических накопителей. Время экспозиции при расходе от 50 мл/дл до 100 мл/дл при обработке поверхностей не более 5 минут (показатель не требует конкретизации). Утилизация: флакон объемом не менее 1 литра.	лтр	60			
2	Дезинфицирующее средство	Средство в виде таблеток массой не менее 2,7 г, содержащих в качестве действующего вещества натриевую соль дисперсионной кислоты не менее 84%. При растворении одна таблетка выделяет 1,50±0,2 г активного хлора (АХ). Рабочие растворы сохраняют активность не менее 3 суток. Допускается возможность многократного использования рабочих растворов на различных объектах. Средство обладает бактерицидными свойствами в отношении грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов, туберкулезных, вирусных (аденовирусы, полиовирусы, гепатит, ВИЧ) и грибковых возбудителей. Средство предназначено для: дезинфекции поверхностей в помещениях; проведения генеральных уборок; дезинфекции ИМП; дезинфекции биологических выделений (кровь, моча, диализ и пр.). Средство обладает универсальными свойствами при дезинфекции поверхностей: -дезинфекция бактериальных инфекций - выход рабочего раствора из 16. средства не менее 3000 л. при экспозиции не более 60 мин. и не менее 1500 л. при экспозиции не более 30 мин.; -дезинфекция туберкулеза - выход рабочего раствора из 16. средства не менее 3000 л. при экспозиции не более 60 мин. и не менее 230 л. при экспозиции не более 30 мин.; -дезинфекция инфекций вирусной этиологии - выход рабочего раствора из 16. средства не менее 3000 л. при экспозиции не более 60 мин. и не менее 1500 л. при экспозиции не более 30 мин.; -дезинфекция грибковых инфекций - выход рабочего раствора из 16. средства не менее 450 л. при экспозиции не более 60 мин. и не менее 230 л. при экспозиции не более 30 мин.; Флаконы: банка (не менее 300 таблеток).	уп	3			
3	Жидкое мыло	Жидкое мыло с антибактериальным эффектом представляет собой готовую к применению однородную жидкость с сбалансированной композицией, предотвращающей избыточную текучесть мыла. В составе мыла входит антибактериальное вещество N,N-бис(3-аминопропанол)додецилдиметиламин 0,2±0,05%, синергетический комплекс поверхностно-активных веществ (ПАВ), увлажняющих и ухаживающих компонентов, в т.ч. 4 классу малоопасных веществ (ГОСТ 12.007-76), не обладает выраженными местно-раздражающими и раздражающими свойствами, в т.ч. раздражающими биологическими выделениями: мебели, полимеров, выделений по поверхности помещений (операционная, приемная, процедурный кабинет, экстренная помощь и др.), трущихся поверхностей, поверхностей медицинских приборов, оптических приборов и оборудования, датчиков (УЗИ и др.), стоматологических накопителей. Средство предназначено для гигиенической обработки рук медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений, в т.ч. рук хирургов, оперирующего медицинского персонала, для санитизации кожных покровов медицинского персонала и пациентов лечебно-профилактических учреждений. Нанесение препарата на склизкую поверхность не оказывает задерживающего действия на санитизацию медицинского персонала перед использованием дезинфицирующего средства не менее 3 мл и не более 5 мл в течение не более 2 минут. Форма выпуска флакон-диспенсер не менее 1 литр, не разбрызгивается средство и антибактериальное вещество не попадает внутрь флакона.	лтр	30			
4	Дезинфицирующее средство	Дезинфицирующее средство, представляющее собой равномерно пропитанные салфетки из нетканого материала. Каждая салфетка должна быть пропитана дезинфицирующим средством в количестве не менее 3 г на одну салфетку. Пропиточная композиция должна представлять собой прозрачную жидкость со слабым характерным запахом спирта и применяемой отдушки. В качестве действующего вещества содержит пролонгатор-28% и синергетический комплекс функциональных добавок: акрилатметилбензилдиметиламинной кислоты 0,02%, ополаскиватель/дезинфицирующее средство в виде порока со слабым специфическим запахом и/или запахом применяемой отдушки. Дезинфицирующее средство должно обладать антибактериальной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов (острые респираторные вирусные инфекции, герпес, Угавокса: полимерная банка - не менее 70 салфеток в одной банке с перфорацией).	упак	80			
5	Дезинфицирующее средство	Дезинфицирующее средство, представляющее собой жидкий концентрат, обязательно содержащее в составе смесь ЧАС и гуанидина. Средство должно обладать утвержденными свойствами: - Дезинфекция поверхностей в отношении вирусов, при этом в обязательном порядке у средства должен быть режим, удовлетворяющий одновременно следующим требованиям: время экспозиции должно лежать в диапазоне от 40 минут до 70 минут в рабочий раствор средства в этом режиме применения должен содержать не менее 0,0025% гуанидина и не менее 0,02805% ЧАС - Дезинфекция ИМП, не совместимой с ПСО, в отношении вирусов, при этом в обязательном порядке у средства должен быть режим, удовлетворяющий одновременно следующим требованиям: время экспозиции должно лежать в диапазоне от 70 минут до 100 минут в рабочий раствор средства в этом режиме применения должен содержать не менее 0,00425% гуанидина и не менее 0,04675% ЧАС - Дезинфекция ИМП, совместимой с ПСО, при этом необходимо, чтобы средство было режимом применения в экзотической в пределах от 40 минут до 70 минут и при этом рабочий раствор средства (а. указанные материалы времени экспозиции 40 минут - 70 минут) должен содержать не менее 0,0085% гуанидина и не менее 0,0335% ЧАС - ПСО (средств дезинфицирующей системы), при этом в обязательном порядке у средства должен быть режим, удовлетворяющий одновременно следующим требованиям: время экспозиции должно лежать в диапазоне от 20 минут до 30 минут в рабочий раствор средства в этом режиме применения должен содержать не менее 0,0042% гуанидина и не менее 0,0468% ЧАС - Дезинфекция белья, при этом наличие режима в интервале времени экспозиции от 70 минут до 100 минут обязательно, в рабочий раствор средства, в интервале указанных допустимых экспозиций (40 минут - 100 минут), должен содержать не менее 0,00425% гуанидина и не менее 0,04675% ЧАС - Дезинфекция посуды, при этом наличие режима в интервале времени экспозиции от 40 минут до 70 минут обязательно, в рабочий раствор средства, в интервале указанных допустимых экспозиций (40 минут - 70 минут), должен содержать не менее 0,00425% гуанидина и не менее 0,04675% ЧАС - Дезинфекция медицинских отходов группы Б, при этом средство обязательно должно иметь режим применения с экспозицией, лежащей в интервале от 70 минут до 100 минут, в рабочий раствор в режиме, с экспозицией, удовлетворяющей указанным условиям (70 минут - 100 минут), должен содержать не менее 0,0085% гуанидина и не менее 0,0235% ЧАС - Дезинфекция поверхностей в отношении плесневых грибов - Дезинфекция крови - Дезинфекция мочи - Дезинфекция санитарно-технического оборудования Срок годности средства-5 лет, рабочих растворов-30 сут. Растворы могут применяться многократно до изменения внешнего вида. При этом необходимо 1 раз в смену проверять концентрацию в памятку тест-полоской. При механизированной обработке растворы используют многократно в течение 1 рабочей смены. Утилизация: флакон объемом не менее 1 литра.	лтр	40			

Цена должна быть указана с учетом доставки до ИТУЗ «Красная клиническая больница» г. Красноярск.

Срок поставки: в течение 5 дней с момента заключения контракта

Информацию необходимо направить до 17:00 4-го февраля 2021 года по факсу 391) 220-15-16, по электронной почте: zoboleva@medgord.ru, volina@medgord.ru и по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-6.

Руководитель контрактной службы /Куликова Н.О./
Печень: Печень Е.В.
Итого: 8 286-5-2021