

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Краевая клиническая больница

ул. П. Железняк, 3, г. Красноярск, 660022

Телефон: 8 (391) 220-16-13

Факс: 8 (391) 220-16-23

E-mail: kkb@medportal.ru

Http://www.kkb1.kras.ru

ОКПО 01913234

ИНН/КПП 2465030876/246501001

Итого: 2020 г. № 262-2020

На № от

О коммерческом предложении

Руководителю

Вышеуказанный документ!

Администрация краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Краевая клиническая больница» просит предоставить коммерческое предложение с указанием цены на следующий товар:

№ п/п	Наименование	Характеристики	Ед. изм.	Ко-во, шт	Цена, рублей	Страна происхождения	Остаточный срок годности
1	Дезинфицирующее средство	Дезинфицирующее средство в виде готовой к применению прозрачной бесцветной жидкости в виде спрея со слабым специфическим запахом и/или запахом применяемой отдушки. Не содержит спиртов. Содержит в качестве действующих веществ полигексаметиленбиглицидин тиохлорид, не менее 0,4% не более 0,8%, феноксиэтанол не менее 0,01% не более 2,1%, а также синтетические компоненты, неогенные поверхностно-активные вещества, вспомогательные компоненты. Антимикробная активность. Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза, вирусов, грибов). Средство обладает выраженными моющими и чистящими свойствами. По параметрам токсичности относится к 4 классу мало опасных веществ (ГОСТ 12.007-76), не обладает выраженными местно-раздражающим, кожно-резорбтивным, десенсибилизирующим свойствами. Средство предназначено для применения в ЛПУ любого профиля для очистки и дезинфекции различных твердых непористых поверхностей и предметов, в т.ч. загрязненных биологическими выделениями: мебели, поверхностей небольших по площади помещений (операционная, приемный покой, процедурный кабинет, изолятор, бокс и т.д.), труднодоступных поверхностей, поверхностей медицинских приборов, оптических приборов и оборудования, датчиков (УЗИ и др.), стоматологических кабинетов. Время экспозиции при расходе 100-50мл/м2 при обработке поверхностей не более 3 минут (показатель не требует конкретизации). Упаковка: флакон объемом не менее 0,5 дм3 с насадкой-распылителем.					
2	Дезинфицирующее средство	Дезинфицирующее средство представляет собой прозрачную бесцветную или слегка желтоватую жидкость со слабым специфическим запахом. В качестве действующих веществ средство должно содержать перекись водорода не менее 14,9% не более 23,1%, полигексаметиленбиглицидин тиохлорид, а также катионные и неогенные поверхностно-активные вещества, антиоксиданты и функциональные добавки. Показатель активности водородных ионов (pH) 1% водного раствора средства в диапазоне не менее 4,0 и не более 7,5. Срок годности рабочих растворов при комнатной температуре не менее 14 суток. Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая возбудителей анаэробных инфекций, туберкулеза), вирусов, грибов, бактериальной этнологии, в т.ч. при туберкулезе), вирусной этнологии, при кандидозах, дерматомикозах, анаэробных инфекциях, особо опасных инфекциях (туля, холера, туляремия, сибирская язва), паразитарных заболеваний. Форма выпуска – емкости из полимерных материалов вместимостью не менее 1лм3 с дезазирующими крышками.					
3	Дезинфицирующее средство	Средство должно выпускаться в виде таблеток массой не менее 2,7 г, содержащих в качестве действующего вещества натриевую соль дихлороацетилуриновой кислоты не менее 84%. При растворении одна таблетка должна выделять не менее 1,50г активного хлора (АХ). Рабочие растворы должны сохранять активность не менее 3 суток. Допускается возможность многократного использования рабочих растворов на различные объекты. Средство должно обладать бактерицидными в отношении грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов, туберкулезными, вирусными (аденовируса, полиомиелита, гепатит, ВПЧ) и фунгицидными (Кандиды) свойствами. Средство должно быть предназначено для: дезинфекции поверхностей в помещениях; проведения генеральных уборок; дезинфекции ИМН; дезинфекции биологических выделений (кровь, моча, ликвор и пр.), медицинских отходов. Средство должно обладать утяжеленными режимами при дезинфекции поверхностей: -дезинфекции бактериальных инфекций - выход рабочего раствора на 16 средства должен быть не менее 3000 л. при экспозиции не более 60 мин. и не менее 1500 л. при экспозиции не более 30 мин.; -дезинфекции туберкулеза - выход рабочего раствора на 16 средства должен быть не менее 780 л. при экспозиции не более 90 мин. и не менее 450 л. при экспозиции не более 60 мин.; -дезинфекции инфекций вирусной этнологии - выход рабочего раствора на 16 средства должен быть не менее 1000 л. при экспозиции не более 60 мин. и не менее 1500 л. при экспозиции не более 30 мин.; -дезинфекции грибовых инфекций - выход рабочего раствора на 16 средства должен быть не менее 780 л. при экспозиции не более 90 мин. и не менее 450 л. при экспозиции не более 60 мин. Фасовка: банка (не менее 300 таблеток).					

4	Сайфетки дезинфицирующее	Дезинфицирующее сайфетки представляют готовые к применению сайфетки белого цвета из нетканого материала, равномерно пропитанные дезинфицирующим средством и помещенные в термостую упаковку. Каждая сайфетка пропитана дезинфицирующим средством, которое представляет собой прозрачную жидкость со слабым характерным запахом спирта и примененной отдушки. В качестве действующего вещества содержит 1-пропанол не менее 24% и не более 28% (показатель не требует конкретизации), ацидопептибетаинаммоний хлорида не менее 0,02% и не более 0,025% и синергетические функциональные добавки (полиаксиметиленамины гидрохлорид, N,N-диокс (3-винилпропанол) дозамиды не менее 0,06%. Сайфетки должны обладать антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (белочная возбудитель внутрибольничных инфекций, микобактерий туберкулеза), вирусов (ОРВИ, гепатиты А, В, С, ВИЧ), грибов Кандида, Трихофитон. Сайфетки должны разрушать на поверхности биологические пленки и обладать хорошими моющими свойствами, не рваться, не биться в комки при использовании и не оставлять остаточной пленки на обрабатываемой поверхности, быть хорошо совместимы с материалами меньшинского оборудования (кроме полимерных водостойких спиртов). По параметрам токсичности должны относиться к 4 классу мало опасных соединений (ГОСТ 12.1.007-76), не вызывать раздражающего и токсического действия, не обладать местно-раздражающим и резорбтивным действием на кожу, не обладать сенсобиблизирующим действием. Сайфетки должны предназначаться для применения в ЛПУ любого профиля для очистки и дезинфекции небольших по площади, труднодоступных для обработки непористых поверхностей в помещениях (исключая изотопные излучатели и материалы, подверженные воздействию спирта), различных предметов, в т.ч. заправленных кровью, мебели, поверхностей медицинских приборов, датчиков диагностического оборудования (УЗИ и др.), термометров, фонендоскопов, осветительной аппаратуры, жалюзи, предметов ухода за больными, телефонных аппаратов, обуви и др. Одноразовая обработка с экспозицией выдержкой - не более 3 мин при бактериальных инфекциях, не более 5 мин при туберкулезе, вирусных инфекциях и дерматомикозах. Сайфетки помещены в упаковку - не менее 120 шт с герметизирующим вкладышем, с термически заваренным краем. После вскрытия упаковки срок годности сайфеток - не менее 1 месяца (а плотно закрытая упаковка при комнатной температуре).						
5	Дезинфицирующее средство	Средство представляет собой гранулы белого цвета. В качестве действующего вещества хлорактивное соединение. Массовая доля активного хлора не менее 50%. Рабочие растворы сохраняют активность не менее 7 суток. Возможно многократное использование рабочих растворов на различные объекты. Средство должно обладать бактерицидными, туберкулоцидными, вирусцидными (гестировано на вирусных полиомеинитах, гепатит В и ВИЧ, аденовирусах) и фунгицидными (Кандида, Трихофитон) свойствами. Средство должно обладать утверждаемыми режимами дезинфекции поверхностей (выход рабочего раствора из одной упаковки средства для дезинфекции поверхностей в отношении туберкулеза составляет 833 литра при экспозиции 60 минут). Средство должно применяться для дезинфекции медицинских изделий, содержащих таблицу применения для генеральной уборки и дезинфекции медицинских отходов. Средство должно быть предназначено для дезинфекции жидких выделений и биологических жидкостей в том числе мочи, фекалий, крови, сыворотки, рвотных масс и прочее. Упаковано в полиэтиленовую емкость. Масса не менее 1 кг.						
6	Дезинфицирующее средство	Дезинфицирующее средство представляет собой раствор в виде прозрачной бесцветной жидкости. Дезинфицирующее средство должно быть предназначено для гигиенической и хирургической обработки рук, для обработки инъекционного и операционного полей. В качестве действующего вещества должно содержать этиловый спирт - не менее 70%, хлорактивна биглюконат - не более 0,5 %. Средство должно обладать бактерицидным действием в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе возбудителей туберкулеза, грибов (включая дрожжеподобные грибы рода Кандида), вирусов (включая аденовирусы, вирус гриппа и др. возбудителей острых респираторных инфекций, вируса гепатитов А, В, С, ВИЧ, полиовирус, энтеровирус, кокакси и ЕСНО, ротавирус). По параметрам токсичности относится к 4 классу мало опасных веществ (ГОСТ 12.007-76). Допускается возможность использования в дозаторе для антисептика с дозатором нажатием на дна 195 мм, ширина 100 мм, высота 335 мм. Флакон объемом не менее 1 литра						
7	Дезинфицирующее средство	Каждый антисептик - готовое к применению дезинфицирующее средство. Должен содержать в качестве действующего вещества спирт (изо-пропанол и/или 1-пропанол), не менее 40 %, четвертичные аммонийные соединения, а также функциональные добавки, усиливающие и ухаживающие за кожей компоненты. Средство не должно содержать в качестве действующих веществ проаналогичных фенолов, третичных аммонийных, полиаксиметиленаминов и биглюконат тироксидов, перекиси водорода, напиксидов, органических бицидных кислот, а также гелеобразователи. Средство должно обладать бактерицидным (в том числе в отношении возбудителей внутрибольничных инфекций) туберкулоцидным, вирусцидным (включая вирусы парентеральных гепатитов, полиомеинита, ВИЧ) и фунгицидным действием. Средство должно обладать пролонгированным антимикробным эффектом. Упаковка флакон объемом не менее 0,1 литра.						

Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Крулевая клиника» г. Красноярск.

Информацию необходимо направить до 17.00 «20» марта 2020 года по факсу (91) 220-15-18, по электронной почте: soboleskva@medsord.ru, arika@medsord.ru и по адресу г. Красноярск, ул. Партзанна Железника 3-6.

Срок поставки: в течение 5 дней с момента заключения контракта

Руководитель контрактной службы _____ /Куликова И.О./

Исполнитель: Попов Е.В.  
 зам. итлевой, тел. 220-15-18
 Адрес электронного документа: Канцелярия/Иск. док. Аптека)

