

Красное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Красная клиническая больница
ул. П. Желникова, 3, г. Красноярск, 660022
Телефон: 8 (391) 220-15-18
Факс: 8 (391) 220-16-23
E-mail: kkb@medgord.ru
http://www.kkb1.kras.ru
ОКПО 01913234
ИНН/КПП 2465030876/246501001
09.06.2020 от 547-2020

Руководитель

О коммерческом предложении

Уважаемый руководитель!

Администрация Красного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Красная клиническая больница» просит предоставить коммерческое предложение с указанием цены на следующий товар:

№ п/п	Наименование	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во, шт	Цена, рублей	Страна происхождения	Остаточный срок годности
1	Дезинфицирующее средство	Кожный антисептик – готовое к применению дезинфицирующее средство. Должен содержать в качестве действующих веществ спирт (изо-пропанол) и/или – пропанол, не менее 40 %, тетрациклические ароматизаторы, а также функциональные добавки: увлажнители и ухаживающие за кожей компоненты. Средство не должно содержать в качестве действующих веществ производных фенола, третичных алкилamine, полиакрилатов, полиакрилатов и бутилметил гидроксида, перекиси водорода, диоксида, органических кислот, а также гелиобразователей. Средство должно обладать бактерицидным (в том числе в отношении возбудителей внутрибольничных инфекций) туберкулицидным, вирулицидным (включая вирусы парентеральных гепатитов, полиовируса, ВИЧ) и фунгицидным действием. Средство должно обладать пролонгированным антимикробным эффектом. Упаковка: флакон объемом не менее 1 литра, подходит под евростандарты.	фл	500			
2	Дезинфицирующее средство	Дезинфицирующее средство представляет собой прозрачную бесцветную или слегка желтоватую жидкость со слабым специфическим запахом. В качестве действующих веществ средство должно содержать перекись водорода не менее 14,9% не более 23,1%, полиакрилатов, полиакрилатов гидроксида, а также катионные и неионные поверхностно-активные вещества, антикоррозийные и функциональные добавки. Показатель активности водородных ионов (рН) 1% водного раствора средства в диапазоне не менее 4,0 и не более 7,5. Срок годности рабочих растворов при комнатной температуре не менее 14 суток. Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая возбудителей анаэробных инфекций, туберкулеза), вирусов, грибов. Средство должно быть предназначено для проведения дезинфекции ИМН, совмещенной с ПСО; дезинфекции и ПСО медицинских инструментов, для дезинфекции различных объектов при инфекциях бактериальной этиологии (в т.ч. при туберкулезе), вирусной этиологии, при клещевых, дерматомикозных, анаэробных инфекциях, особо опасных инфекциях (туб. холера, туляремия, сибирская язва), паразитарных заболеваниях. Форма выпуска – емкости из полимерных материалов вместимостью не менее 1лм3 с дезинфицирующими крышками.	фл	200			
3	Салфетки дезинфицирующие	Дезинфицирующие салфетки представляют готовые к применению салфетки белого цвета из нетканого материала, равномерно пропитанные дезинфицирующим средством и помещенные в герметичную упаковку. Каждая салфетка пропитана дезинфицирующим средством, которое представляет собой прозрачную жидкость со слабым характерным запахом спирта и приятной отдушкой. В качестве действующего вещества содержит 1-пропанол не менее 24% и не более 28% (показатель не требует конкретизации), алкодилов, бензиламиний хлорид не менее 0,02% и не более 0,025% и синергетические функциональные добавки (полиакрилатов, полиакрилатов гидроксида, N,N-бис (3-аминопропанол) додециламины не менее 0,06%. Салфетки должны обладать антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерий туберкулеза), вирусов (ОРВИ, гепатиты А, В, С, ВИЧ), грибов Кандида, Трихофитии. Салфетки должны разрушать на поверхности биологические пленки и обладать хорошими моющими свойствами, не рваться, не обсыпаться в комки при использовании и не оставлять остаточной пленки на обработанной поверхности, быть хорошо совместимыми с материалами медицинского оборудования (кроме подверженных воздействию спирта). По параметрам токсичности должны относиться к 4 классу мало опасных соединений (ГОСТ 12.1.007-76), не вызывать раздражающего и токсического действия, не обладать местно-раздражающим и резорбтивным действием на кожу, не обладать сенсибилизирующим действием. Салфетки должны предназначаться для применения в ЛПУ любого профиля для очистки и дезинфекции небольших по площади, труднодоступных для обработки непористых поверхностей в помещениях (исключая изготовленные из материалов, подверженных воздействию спирта), различных предметов, в т.ч. загрязненных кровью: мебели, поверхности медицинских приборов, датчиков диагностического оборудования (УЗИ и др.), термометров, фонендоскопов, осветительной аппаратуры, жалюзи, предметов ухода за больными, телефонных аппаратов, обуви и др. Однократная обработка с экспозиционной выдержкой – не более 3 мин при бактериальных инфекциях, не более 5 мин при туберкулезе, вирусных инфекциях и дерматомикозах. Салфетки помещены в упаковку – не менее 120 шт с герметизирующим клапаном, с герметично заваренным краем. После вскрытия упаковки срок годности салфеток – не менее 1 месяца (в плотно закрытых пакетах при комнатной температуре).	уп	1000			
4	Дезинфицирующее средство	Средство должно выпускаться в виде таблеток массой не менее 2,7 г, содержащих в качестве действующего вещества натриевую соль дихлороацетилфосфоновой кислоты не менее 84%. При растворении одна таблетка должна выделять не менее 1,50г активного хлора (АХ). Рабочие растворы должны сохранять активность не менее 3 суток. Допускается возможность многократного использования рабочих растворов на различных объектах. Средство должно обладать бактерицидным в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, туберкулицидным, вирулицидным (аденовирусы, полиовирус, гепатит, ВИЧ) и фунгицидным (Кандида) свойствами. Средство должно быть предназначено для: дезинфекции поверхностей в помещениях; проведения генеральных уборок; дезинфекции ИМН; дезинфекции биологических выделений (кровь, моча, слюна и пр.), медицинских отходов. Средство должно обладать универсальными режимами при дезинфекции поверхностей: -дезинфекция бактериальных инфекций – выход рабочего раствора из 16, средства должен быть не менее 3000 л при экспозиции не более 60 мин и не менее 1500 л при экспозиции не более 30 мин; -дезинфекция туберкулеза – выход рабочего раствора из 16, средства должен быть не менее 780 л при экспозиции не более 90 мин и не менее 450 л при экспозиции не более 60 мин; -дезинфекция инфекций вирусной этиологии – выход рабочего раствора из 16, средства должен быть не менее 3000 л при экспозиции не более 60 мин и не менее 1500 л при экспозиции не более 30 мин; -дезинфекция грибковых инфекций – выход рабочего раствора из 16, средства должен быть не менее 780 л при экспозиции не более 90 мин и не менее 450 л при экспозиции не более 60 мин. Упаковка: банка (не менее 300 таблеток).	уп	500			
5	Салфетки дезинфицирующие	Дезинфицирующие салфетки представляют готовые к применению салфетки белого цвета из нетканого материала, равномерно пропитанные дезинфицирующим средством и помещенные в герметичную упаковку. Каждая салфетка пропитана дезинфицирующим средством, которое представляет собой прозрачную жидкость со слабым характерным запахом спирта и приятной отдушкой. В качестве действующего вещества содержит 1-пропанол не менее 24% и не более 28% (показатель не требует конкретизации), алкодилов, бензиламиний хлорид не менее 0,02% и не более 0,025% и синергетические функциональные добавки (полиакрилатов, полиакрилатов гидроксида, N,N-бис (3-аминопропанол) додециламины не менее 0,06%. Салфетки должны обладать антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерий туберкулеза), вирусов (ОРВИ, гепатиты А, В, С, ВИЧ), грибов Кандида, Трихофитии. Салфетки должны разрушать на поверхности биологические пленки и обладать хорошими моющими свойствами, не рваться, не обсыпаться в комки при использовании и не оставлять остаточной пленки на обработанной поверхности, быть хорошо совместимыми с материалами медицинского оборудования (кроме подверженных воздействию спирта). По параметрам токсичности должны относиться к 4 классу мало опасных соединений (ГОСТ 12.1.007-76), не вызывать раздражающего и токсического действия, не обладать местно-раздражающим и резорбтивным действием на кожу, не обладать сенсибилизирующим действием. Салфетки должны предназначаться для применения в ЛПУ любого профиля для очистки и дезинфекции небольших по площади, труднодоступных для обработки непористых поверхностей в помещениях (исключая изготовленные из материалов, подверженных воздействию спирта), различных предметов, в т.ч. загрязненных кровью: мебели, поверхности медицинских приборов, датчиков диагностического оборудования (УЗИ и др.), термометров, фонендоскопов, осветительной аппаратуры, жалюзи, предметов ухода за больными, телефонных аппаратов, обуви и др. Однократная обработка с экспозиционной выдержкой – не более 3 мин при бактериальных инфекциях, не более 5 мин при туберкулезе, вирусных инфекциях и дерматомикозах. Салфетки помещены в упаковку – не менее 120 шт с герметизирующим клапаном, с герметично заваренным краем. После вскрытия упаковки срок годности салфеток – не менее 1 месяца (в плотно закрытых пакетах при комнатной температуре).	уп	1000			

Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Красная клиническая больница» г. Красноярск.

Срок поставки: в течение 5 дней с момента заключения контракта. Информацию необходимо направить до 17:00 «08» июня 2020 года по факсу (391) 220-15-18, по электронной почте: kbb@medgord.ru, kbb@medgord.ru и по адресу г. Красноярск, ул. Паргомына Желникова 3-6.

Руководитель контрактной службы: Куликова И.О./

Исполнитель: Попова Е.В. тел. 220-15-18
Адрес электронного документа: kbb@medgord.ru, kbb@medgord.ru