

© КОММЕРЧЕСКОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ

Уважаемый руководитель!

Администрация краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Красная клиническая больница» просит предоставить коммерческое предложение с указанием цены на следующий товар:

№ п/п	Наименование	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во, шт	Цена, рублей	Страна происхождения	Остаточный срок годности
1	Дезинфицирующее средство	Дезинфицирующее средство представляет собой прозрачную бесцветную или слегка желтоватую жидкость со слабым специфическим запахом. В качестве действующих веществ средство должно содержать перекись водорода не менее 14,9% не более 23,1%, полигексаметиленглицид гидрохлорид, а также катионные и неионные поверхностно-активные вещества, антикоррозийные и функциональные добавки. Показатель активности перекиси водорода (НП) 1% водного раствора средства в диапазоне не менее 4,0 и не более 7,5. Срок годности рабочих растворов при комнатной температуре не менее 14 суток. Средство должно обладать антибактериальной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (исключая возбудителей анаэробных инфекций, туберкулеза), вирусов, грибов. Средство должно быть предназначено для проведения дезинфекции ИМП, совмещенной с ПСО; дезинфекции и ПСО медицинских инструментов, для дезинфекции различных объектов при инфекциях бактериальной этиологии, в т.ч. при туберкулезе), вирусной этиологии, при кандидозе, дерматомикозе, микробактериальных, особо опасных инфекциях (чума, холера, туляремия, сибирская язва), парентеральных заболеваний. Форма выпуска – емкости из полимерных материалов вместимостью не менее 120л с дезинфицирующим крышками.	шт	6			
2	Салфетки дезинфицирующие	Дезинфицирующие салфетки представляют готовые к применению салфетки белого цвета из нетканого материала, равномерно пропитанные дезинфицирующим средством и помещенные в герметичную упаковку. Каждая салфетка пропитана дезинфицирующим средством, которое представляет собой прозрачную жидкость со слабым характерным запахом спирта и привкусом этилового спирта. В качестве действующего вещества содержит 1-пропанол не менее 24% и не более 28% (показатель не требует конкретизации), алкилдиметилоксибензиламмоний хлорид не менее 0,02% и не более 0,025% и синергистические функциональные добавки (полигексаметиленглицид гидрохлорид, N,N-бис (3-аминопропанол) додецилсульфат не менее 0,06%). Салфетки должны обладать антибактериальной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (исключая возбудителей микотриболических инфекций, микобактерий туберкулеза), вирусов (ОРВИ, гепатиты А, В, С, ВИЧ), грибов рода Кандида, Трифитон. Салфетки должны разрушать на поверхности биологические пленки и обладать жаростойкими свойствами и не рваться, не обрываться в комки при использовании и не оставлять остаточной пленки на обрабатываемой поверхности, быть хорошо совместимы с материалами медицинского оборудования (кроме подверженных воздействию спирта). По параметрам точности должны относиться к 4 классу мало опасных соединений (ГОСТ 12.1.007-76, не вызывать раздражающего и токсического действия, не обладать местно-раздражающим и резолубионным действием на кожу, не обладать sensibiliziruyuschimi действием. Салфетки должны предназначаться для применения в ЛПУ любого профиля для очистки и дезинфекции небольших по площади труднодоступных для обработки непористых поверхностей в помещениях (после окончания использования из материала, подверженных воздействию спирта), различных предметов, в т.ч. загрязненных кровью: мебели, поверхности медицинских приборов, датчиков диагностического оборудования (УЗИ и др.), термометров, фонендоскопов, осветительной аппаратуры, жалюзи, предметов ухода за больными, телефонных аппаратов, обуви и др. Очисточная обработка с экспозиционной выдержкой – не более 3 мин при бактериальных инфекциях, не более 5 мин при туберкулезе, микотриболических инфекциях и дерматомикозах. Салфетки помещены в упаковку – не менее 120 шт с герметизирующим клапаном, с герметично закрытым краем. После вскрытия упаковки срок годности салфеток – не менее 1 месяца (в плотно закрытых пакетах при комнатной температуре).	ушк.	15			
3	Дезинфицирующее средство	Средство должно выпускаться в виде таблеток массой 3,14-3,5г, содержащих в качестве действующего вещества натриевую соль дихлороацетатсукциновой кислоты не менее 83,9% и не более 84,1%. При растворении одна таблетка должна выделять 1,52(0,1)г активного хлора (АХ). Срок годности средства должен быть не менее 3 лет. Рабочие растворы должны сохранять активность не менее 5 суток. Возможность многократного использования рабочих растворов на различные объекты. Рабочие растворы не должны обладать моющими свойствами. Средство должно обладать бактерицидными в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, туберкулезными, вирусными (аденовирусы, полиовирусы, гепатит, ВИЧ) и фунгицидными (Кандида) свойствами. Средство должно быть предназначено для: дезинфекции поверхностей в помещениях, проведения генеральных уборок, дезинфекции ИМП, дезинфекции биологических выделений (кровь, моча, дождор и пр.), медицинских отходов. Средство должно обладать антибактериальными свойствами при дезинфекции поверхностей: - дезинфекции бактериальных инфекций – выход рабочего раствора из 16. средства должен быть не менее 3150 л. при экспозиции не более 60 мин. и не менее 1575 л. при экспозиции не более 30 мин; - дезинфекции туберкулеза – выход рабочего раствора из 16. средства должен быть не менее 787,5 л. при экспозиции не более 60 мин. и не менее 450 л. при экспозиции не более 30 мин; - дезинфекции инфекций вирусной этиологии – выход рабочего раствора из 16. средства должен быть не менее 3150 л. при экспозиции не более 60 мин. и не менее 1575 л. при экспозиции не более 30 мин; - дезинфекции грибковых инфекций – выход рабочего раствора из 16. средства должен быть не менее 787,5 л. при экспозиции не более 60 мин. и не менее 450 л. при экспозиции не более 30 мин. Фасовка: банка (в плотно закрытых пакетах при комнатной температуре).	шт	7			
4	Дезинфицирующее средство	Быстродействующий бактерицид и вирулицид дезинфекционная экспозиция не более 10 минут. Дезинфицирующее средство представляет собой готовую к применению прозрачную жидкость. В качестве действующего вещества средство должно содержать алкилдиметилоксибензиламмоний хлорид не менее 0,02%, N,N-бис(3-аминопропанол) додецилсульфат не более 0,06%, 1-пропанол не более 28%. Форма выпуска – флаконы с распылительной насадкой. Средство должно обладать антибактериальной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (исключая возбудителей микотриболических инфекций, микобактерий туберкулеза, микотриболических инфекций), вирусов (гепатит, ВИЧ-инфекция), грибов рода Кандида, Трифитон. Средство должно быть предназначено: для экстренной дезинфекции небольших по площади помещений, труднодоступных поверхностей в помещениях; медицинских приборов и оборудования; оборудования и поверхности санитарного транспорта после транспортировки инфицированного больного, загрязненного белья, предметов медицинского назначения и т.д.; реанимационных и гигиенических мероприятий. Быстродействующий бактерицид и вирулицид дезинфекционная экспозиция не более 10 минут.	шт	12			
5	Жидкое мыло	Жидкое мыло с антибактериальным эффектом представляет собой готовую к применению однородную жидкость с обонятельной консистенцией, предотвращающей избыточную текучесть мыла. В состав мыла входит антибактериальное вещество N,N-бис(3-аминопропанол) додецилсульфат 0,24-0,05 %, синергистический комплекс поверхностно-активных веществ (ПАВ), увлажняющие и умягчающие грамположительных (исключая микобактерий туберкулеза) бактерий. По параметрам острой токсичности, согласно классификации ГОСТ 12.1.007-76, при нанесении на кожу и введении в желудок относится к 4 классу малотоксичных соединений. Методом разбавления и количественного определения содержания ПАВ в мыле. Средство должно обладать антибактериальной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (исключая возбудителей микотриболических инфекций, микобактерий туберкулеза), вирусов (исключая вирус парентеральных гепатитов, полиовируса, ВИЧ, вируса гриппа, в том числе: гриппа H1N1, гриппа H5N1), грибов рода Кандида и Трифитон. Средство обладает дезинфицирующим, дезинфицирующим, дезинфицирующим действием при применении в лечебно-профилактических учреждениях, в т.ч. для рук хирурга, оперирующего медицинского персонала, для санитарной обработки кожных покровов медицинского персонала и пациентов лечебно-профилактических учреждений. Нанесение препарата на скрипированную кожу не оставляет закаливания искусственно нанесенных ран. Средство вызывает слабо выраженный раздражающий эффект при контакте на слизистую оболочку глаз. Режим гигиенической обработки рук хирурга и оперирующего медицинского персонала перед использованием дезинфицирующего средства не менее 3 мин и не более 5 мин в течение не более 2 минут. Форма выпуска флакон-диспенсер не менее 1 литр. Дозирующее устройство обладает максимально точным дозированием мыла и возможностью использования "по последней капле", мыла и контактирующее содержимое не выпадает внутри флакона, не разбрызгивается средство и нет блокады выходного отверстия.	шт	78			
6	Дезинфицирующее средство	Дезинфицирующее средство (жидкий антисептик) представляет собой готовый к применению бесцветный прозрачный жидкий раствор со слабым специфическим запахом или с запахом привкусом этилового спирта. Не содержит спирта. В качестве действующего вещества средство содержит полигексаметиленглицид гидрохлорид – не менее 0,49% и не более 0,51%, 2-феноксиэтанол – не менее 1,5% и не более 2,5%, а также синергистические добавки, увлажняющие и умягчающие за кожей компоненты. Срок годности средства – не менее 5 лет. Средство обладает антибактериальной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (в том числе микобактерий туберкулеза), вирусов (исключая вирус парентеральных гепатитов, полиовируса, ВИЧ, вируса гриппа, в том числе: гриппа H1N1, гриппа H5N1), грибов рода Кандида и Трифитон. Средство предназначено для применения в лечебно-профилактических учреждениях для гигиенической обработки рук для обработки рук хирурга и оперирующего медицинского персонала перед использованием дезинфицирующего средства не менее 3 мин и не более 5 мин в течение не более 2 минут. Фасовка: флакон-диспенсер не менее 1 литр. Дозирующее устройство обладает максимально точным дозированием мыла и возможностью использования "по последней капле", мыла и контактирующее содержимое не выпадает внутри флакона, не разбрызгивается средство и нет блокады выходного отверстия.	ушк.	93			
7	Салфетки дезинфицирующие	Дезинфицирующие салфетки представляют собой равномерно пропитанные салфетки из нетканого материала. Пропитка должна содержать 1-пропанол не более 28% и синергистические функциональные добавки: алкилдиметилоксибензиламмоний хлорид не менее 0,02%, полигексаметиленглицид гидрохлорид не менее 0,04%, N,N-бис (3-аминопропанол) додецилсульфат не менее 0,02%, а также синергистические функциональные добавки. Показатель активности перекиси водорода (НП) 1% водного раствора средства в диапазоне не менее 4,0 и не более 7,5. Срок годности салфеток – не менее 24 месяцев со дня изготовления в герметично закрытой упаковке при комнатной температуре. Салфетки должны обладать антибактериальной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (исключая возбудителей микотриболических инфекций, микобактерий туберкулеза, микотриболических инфекций), вирусов (острые респираторные вирусные инфекции, герпес, полиовирус, гепатиты всех видов, включая гепатиты А, В и С, ВИЧ-инфекцию, аденовирус и др.), грибов рода Кандида, Трифитон. Активно разрушают на поверхности биологические пленки; обладают жаростойкими свойствами. Салфетки должны обладать высокой прочностью; при использовании не рваться, не обрываться в комки и не оставлять остаточной пленки на обрабатываемой поверхности; должны быть совместимы с материалами медицинского оборудования. Упаковка: полимерная банка – не менее 70 салфеток в одной ленте с перфорацией.	ушк.	450			

8	Дезинфицирующее средство	Дезинфицирующее средство, представляющее собой жидкую консистенцию, обязательно содержащее в составе смесь ЧАС и гуанидина. Средство должно обладать утвержденными режимами: - Дезинфекция поверхностей в отношении вирусов, при этом в обязательном порядке у средства должен быть режим, удовлетворяющий одновременно следующим требованиям: время экспозиции должно лежать в диапазоне от 40 минут до 70 минут в рабочий раствор средства в этом режиме применения должен содержать не менее 0,0025% гуанидина и не менее 0,02805% ЧАС - Дезинфекция ИМН, не совмещенной с ПСО, в отношении вирусов, при этом необходимо, чтобы средство имело режим применения с экспозицией в пределах от 70 минут до 100 минут и при этом рабочий раствор средства (в указанном интервале времени экспозиции 70 минут - 100 минут) содержал не менее 0,00425% гуанидина и не менее 0,04675% ЧАС - Дезинфекция ИМН, совмещенной с ПСО, при этом наличие режима с интервалом времени экспозиции от 40 минут до 70 минут обязательно, а рабочий раствор средства, в интервале указанных допустимых экспозиций (40 минут - 70 минут), должен содержать не менее 0,0085% гуанидина и не менее 0,0935% ЧАС - ПСО (предстерилизационной очисткой), при этом необходимо, чтобы средство имело режим применения с экспозицией в пределах от 20 минут до 30 минут и при этом рабочий раствор средства (в указанном интервале времени экспозиции 20 минут - 30 минут) содержал не менее 0,0042% гуанидина и не менее 0,0046% ЧАС - Дезинфекция белья, при этом необходимо, чтобы средство имело режим применения с экспозицией в пределах от 70 минут до 100 минут и при этом рабочий раствор средства (в указанном интервале времени экспозиции 70 минут - 100 минут) содержал не менее 0,00425% гуанидина и не менее 0,04675% ЧАС - Дезинфекция посуды, при этом наличие режима с интервалом времени экспозиции от 40 минут до 70 минут обязательно, а рабочий раствор средства, в интервале указанных допустимых экспозиций (40 минут - 70 минут), должен содержать не менее 0,00425% гуанидина и не менее 0,04675% ЧАС - Дезинфекция медицинских отходов группы Б, при этом необходимо, чтобы средство имело режим применения с экспозицией в пределах от 70 минут до 100 минут и при этом рабочий раствор средства (в указанном интервале времени экспозиции 70 минут - 100 минут) содержал не менее 0,0085% гуанидина и не менее 0,0935% ЧАС - Дезинфекция поверхностей в отношении плесневых грибов - Дезинфекция кожи - Дезинфекция санитарио-технического оборудования Срок годности средства-5лет, рабочих растворов-30сут. Растворы могут применяться многократно до изменения внешнего вида. При этом необходимо 1 раз в смену проверять концентрацию с помощью тест-полосок. При экспозиционной обработке растворы используются многократно в течение 1 рабочей смены. Объем 1 л.	шт	20				
9	Дезинфицирующее средство	Дезинфицирующее средство, представляющее собой готовый раствор, жидкой консистенции, обязательно содержащее в составе смесь прополисовых спиртов и ЧАС. - Дезинфекция кожных покровов (Руки хирурга: наносит средство дважды по 5мл. Общее время обработки составляет 5мин.). Срок годности средства-3года. Объем 0,5 мл	шт	124				
10	Дезинфицирующее средство	Дезинфицирующее средство в виде готовой к применению прозрачной бесцветной жидкости в виде спрея со слабым специфическим запахом и/или запахом применяемой отдушки. Не содержит спиртов. Содержит в качестве действующих веществ полигексаметиленгуанидин гидрохлорид не менее 0,4% не более 0,8%, феноксиэтанол не менее 0,91% не более 2,1%, а также синтетические компоненты, обеспечивающие поверхностно-активные свойства, вспомогательные компоненты. Антимикробная активность. Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза, вирусов, грибов). Средство обладает выраженными моющими и моющими свойствами. По параметрам токсичности относится к 4 классу мало опасных веществ (ГОСТ 12.007-76), не обладает выраженными местно-раздражающими, кожно-резорбтивными, десенсибилизирующими свойствами. Средство предназначено для применения в ЛПУ любого профиля для очистки и дезинфекции различных твердых непористых поверхностей и предметов, в т.ч. загрязненных биологическими выделениями: мебели, поверхностей небольших по площади помещений (операционная, приемный покой, процедурный кабинет, холитер, бокс и т.д.), труднодоступных поверхностей, поверхностей медицинских приборов, оптических приборов и оборудования, датчиков (УЗИ и др.), стоматологических наконечников. Время экспозиции при расходе 100-150мл/м² при обработке поверхностей не более 5 минут (показатель не требует конкретизации). Упаковка: флакон объемом не менее 0,5 дм³ с насосной-распылителем.	шт	20				
11	Дезинфицирующее средство	Средство должно представлять собой прозрачную жидкость от бесцветного до синего цвета с запахом применяемой отдушки. В качестве действующего вещества содержит четвертичные аммониевые соединения (бензилдиметилоксиэтиламмоний хлорид и дидецилдиметилоксиэтиламмоний хлорид) 12,5%, молочную кислоту 1,5%, полигексаметиленгуанидин гидрохлорид 0,5%, а также вспомогательные компоненты: неионные ПАВ, комплексообразователи, отдушка, красители и вода. Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерий туберкулеза, кишечных инфекций, аэробной инфекции), особо опасных инфекций (туба, холера, туляремия, лептоспироз), вирусов (включая возбудителей вирусных заболеваний человека (острые респираторные вирусные инфекции, герпес, полиомиелит, папиллома, ВИЧ-инфекция, аденовирус, вирус эпштейна-барри (SARS), "птичьего" гриппа АН5N1, "свиного" гриппа АН1N1 и пр.), грибов. Должно обладать оцидривными свойствами в отношении возбудителей паразитарных болезней (цист, и ооцист простейших, яиц и личинок гельминтов, острей). Обладать моющими моюще-дезинфицирующими свойствами. Средство должно быть предназначено для дезинфекции поверхностей из любых материалов, за исключением пористых и из пористых материалов (в том числе датчиков УЗИ, стоматологических наконечников), в качестве кожного антисептика: для обработки рук хирурга и других медицинских работников перед выполнением манипуляций; гигиенической обработки рук. Средство по параметрам острой токсичности должно относиться по ГОСТ 12.1.007-76 к 3 классу умеренно опасных веществ при вдыхании и к 4 классу малоопасных веществ при нанесении на кожу. Не должно обладать кожно-резорбтивной и сенситизирующей активностью. Средство предназначено для: дезинфекции лямпы помещений и оборудования (в том числе оборудования имеющего контакт с пищевыми продуктами, посудой, кружкового инвентаря, для дезинфекции помещений и оборудования в ЛПУ любого профиля, дезинфекции, в т.ч. совмещенной с ПСО изделий медицинского назначения, дезинфекции пищевых вин, дискованных почем, предметов обихода. Средство должно обладать утвержденными режимами при: дезинфекции (поверхностей) бактериальных, грибковых, вирусных инфекций - 0,1-2% при экспозиции 15-90мин. Фасовка: флакон не менее 1,0 дм³.	шт	25				

Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Областная клиническая больница» г. Красноярск.

Срок поставки: в течение 10 дней с момента заключения контракта

Информацию необходимо направить до 17.00 «12» февраля 2020 года по факсу (391) 220-15-18, по электронной почте: kbolevskaya@medgost.ru, arloka@medgost.ru и по адресу г. Красноярск, ул. Пархоменко Железняка 3-6.

Руководитель контрактной службы

/Куликova И.О./

Исполнитель: Попова Е.В.

Адрес электронной почты: kbolevskaya@medgost.ru, arloka@medgost.ru, тел. 220-15-18

Адрес электронной почты: kbolevskaya@medgost.ru, arloka@medgost.ru